

CAM360 AmnioGraft™

Guía del paciente

Uso de CAM360 AG con
Escudo de Colágeno (CS)



Hasta 72 horas

Aplicaciones clínicas



Queratoconjuntivitis seca
(síndrome del ojo seco)



Queratitis neurotrófica
Sensibilidad corneal reducida

Instrucciones de uso

- Asegúrese de lavarse las manos antes de cualquier contacto con los ojos durante el tratamiento.
- **Aplique lágrimas artificiales sin conservantes al menos tres veces al día.**
- El ojo tratado debe permanecer vendado entre 48 y 72 horas.
- Para remover el vendaje, se debe mantener el ojo cerrado y despegar suavemente la cinta.
- Despues de remover la cinta, continúe aplicando las lágrimas artificiales sin conservantes tres veces al día.
- Si el CS o el tejido se desprende, o se sale después de retirar la cinta, no es preciso preocuparse. Notifíquese a su proveedor de asistencia médica en su consulta de seguimiento.
- **Evite** restregarse los ojos durante el tratamiento.
- **Evite** la exposición directa del ojo al agua durante el tratamiento.
- **Evite** la exposición ocular a aerosoles, fijador de cabellos, cosméticos, lociones, etc.

Alergias y advertencias

- Si tiene alergia al colágeno o a los productos de origen bovino, debe informarlo a su proveedor de asistencia médica. No se someta al tratamiento con CS. Los posibles síntomas de reacción alérgica pueden incluir enrojecimiento, lagrimeo, picor o hinchazón.
- Es posible que experimente una sensación temporal de escozor tras la inserción del CS, que desaparecerá en unos instantes. En caso contrario, informe a su médico.